

## ALGORYTM POSTĘPOWANIA – TRIAŻ w szpitalach niezakaźnych

### Pacjent bezobjawowy – NAMIOT A (albo inny obszar czysty)

#### A1. Pacjent bezobjawowy

- Otrzymuje ulotkę informacyjną (zał. 2)
- Postępuje zgodnie z podanymi zaleceniami

#### A2. Pacjent bezobjawowy z kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2

- Wypełnia ankietę (zał. 1)
- Postępuje zgodnie z podanymi zaleceniami
- Należy pobrać materiał w kierunku SARS-CoV-2 i zgłosić podejrzenie do PSSE
- Należy zorganizować transport do izolatorium lub innego miejsca wskazanego przez PSSE (w uzgodnieniu z dyspozytorem)

### Pacjent z objawami – NAMIOT B (albo inny obszar brudny)

**Ocena pielęgniarki/ratownika medycznego:**  
ciepłota ciała, liczba oddechów, SaO<sub>2</sub>

#### B1. Pacjent skąpoobjawowy

T < 38 °C, liczba oddechów < 20/min, SaO<sub>2</sub> > 95 %

- Skierować do pomieszczenia zapewniającego izolację
- Konsultacja lekarska w ciągu 4 godzin

- Pobrać materiał w kierunku SARS-CoV-2
- Zgłosić podejrzenie do PSSE
- Włączyć leczenie objawowe
- Odeśłać do izolatorium lub innego miejsca wskazanego przez PSSE

O wyniku badania i dalszych zaleceniach Pacjenta informuje pracownik PSSE

Przyjęcie do oddziału/kliniki odpowiedniego dla stanu pacjenta

#### B2. spełniony **którykolwiek** z warunków:

T > 38 °C, liczba oddechów > 20/min; SaO<sub>2</sub> < 95%

- Skierować na SOR/IP do pomieszczenia zapewniającego izolację
- **konsultacja lekarza w pierwszej kolejności**
- wdrożenie postępowania ratującego życie, jeśli niezbędne (w oddziale przejściowym lub w inny sposób zapewniający odizolowanie pacjenta)

- Pobrać badania w kierunku SARS-CoV-2
- Zgłosić podejrzenie do PSSE

Negatywny wynik badania

Pozytywny wynik = wykryto SAR-CoV-2 RNA

Kontakt z najbliższym oddziałem zakaźnym dedykowanym COVID-19

Telefon.....